

TABLA 1**Situaciones en las que se comparte la información referente al proceso clínico del paciente**

Situación	Ejemplos
Incapacidad judicial	Enfermo con demencia senil, con sentencia judicial de incapacitación.
Incapacidad transitoria, física o psíquica, para comprender su situación	Intoxicación etílica grave
Situación de emergencia	Hemorragia arterial
Menor de 12 años sin capacidad de comprender	Recién nacido
Riesgo para la salud pública	Tuberculosis
Privilegio terapéutico (estado de necesidad terapéutico): derecho del facultativo de no informar al paciente si considera que la información puede ser perjudicial para el enfermo	Paciente depresivo con diagnóstico de cáncer de páncreas

TABLA 2**Consentimiento informado en menores de edad****Quién consiente**

Paciente	Características	¿Quién consiente?
>16 años o menor emancipado	Con adecuada capacidad para comprender	El propio paciente (salvo las 3 excepciones)
12-16 años	Maduro	Los padres
	inmaduro	
<12 años		(si tiene 12 años o más será escuchado)

TABLA 3**Muertes que no se pueden certificar**

Muertes de causa traumática	Accidente de tráfico Accidente laboral Por arma blanca o de fuego Quemaduras Electrocución
Muertes por asfixia	Por ahorcamiento Por estrangulación Ahogados Atragantamiento Aspiración de vómitos Por compresión tóraco-abdominal
Muertes por causa tóxica	Reacción adversa a drogas Coma etílico Suicidios por medicamentos Intoxicación laboral o doméstica Intoxicación alimentaria
Muertes por complicaciones de causa violenta	Embolia grasa por fractura de fémur
Muertes súbitas o sospechosas de criminalidad	

TABLA 4**Obligación de parte judicial**

Maltrato a menores e incapaces
 Violencia de género
 Agresiones sexuales
 Heridas por arma blanca o de fuego
 Accidentes de tráfico o accidentes laborales
 Abortos no incluidos entre los supuestos legales
 A petición del lesionado
 Envenenamiento e intoxicación
 Agresiones y peleas
 Auxilio o cooperación al suicidio
 Muertes de causa no natural
 Lesiones de origen sospechoso
 Cualquier otra que pudiera suponer un delito.

Factores de riesgo de sufrir un episodio violento

- Trabajar sólo
- Escasez de personal
- Trabajar en lugares aislados o alejados
- Estilos de gestión rígidos, autoritarios; presiones para aumentar la productividad
- Masificación en las salas de espera o en malas condiciones, mal diseño ambiental
- Exceso de confluencia de público, familias alteradas en las salas de espera
- Esperas prolongadas para ser atendidos
- Errores en citaciones, diagnósticos o terapéuticos
- Falta de entrenamiento en detectar y abordar al agresor
- Ausencia de medidas de seguridad
- Movimientos no restringidos de público en las consultas
- Pasillos o salas solitarios o poco iluminados
- Trabajo con enfermos mentales o consumidores de alcohol y /o drogas. Disponibilidad de drogas en el centro
- Atención en domicilio, pisos tutelados, albergues, atención a detenidos, inspección médica
- Traslados de pacientes
- Trabajar en zonas socialmente conflictivas.

Fuente: Fundación CESM. Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación. Madrid: 2007.